

RECOMENDACIONES DE USO

Coloque Ratador al encontrar signos de presencia de roedores.

USO	LUGAR	DOSIS
Casas, edificios, instalaciones agroindustriales, molinos, lecherías, bodegas, etc.	Interior y exterior dentro de tubos cebaderos protegidos, en lugares ocultos como canaletas, alcantarillas, orillas de canales y tránsito de roedores.	Según el nivel de infestación, colocar 20 a 40 g de Ratador bloque. Para ratas colocar cada 5 a 10 Mts y para ratones colocar 20 g cada 2 a 4 Mts.

Consideraciones:

Una vez instalados los cebos efectuar monitoreo y realizar la reposición de los bloques consumidos cada 15 a 20 días, hasta que cese el consumo.

Precauciones Generales:

- No comer, beber ni fumar durante la manipulación y aplicación del producto.
- Utiliza guantes largos impermeables al manipular el producto.
- El producto debe ser manipulado por personas responsables.
- Almacenar en lugar fresco, seco, lejos de alimentos y animales domésticos.
- En caso de ingestión trasladar a la persona con el envase al centro médico más cercano.
- No se requiere tiempo de espera para reingreso al área tratada.
- Al finalizar su aplicación, lave sus manos con abundante agua y jabón.



Bloque

Efectivo en una sola dosis

Plagas que controla: Ratador bloque mata todo tipo de ratas y ratones Urbanos y Silvestres.

- Potente Raticida Anticoagulante de última generación.
- Ratador controla todo tipo de ratas, ratones y lauchas con una sola ingestión.
- Los roedores mueren a los 5 a 8 días después de la ingesta, lejos del lugar de consumo.
- Su presentación en cebo le otorga características de alta palatabilidad y aceptación por parte de los roedores.

Fecha de vencimiento:

Contenido Neto:

Numero de Lote:

Condición de Venta: Venta General

Composición:

Bromadiolona(*).....0,005% p/v - N° CAS: 28772-56-7
Cera parafínica, mezcla de cereales, azúcar, benzoato de detanionium y colorante. c.s.p 100 g.
(*)3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4'-bromobifenil-4-il)-3-hidroxi-1-fenilpropil]-4-hidroxicoumarina

NO INFLAMABLE – NO EXPLOSIVO – NO CORROSIVO

Primeros auxilios: En caso de ingestión: no inducir vómito ni dar a beber líquidos, llamar a un médico. En caso de contacto con los ojos: lavar con abundante agua durante 15 minutos, buscar atención médica. En caso de inhalación: trasladar a la víctima fuera del área de exposición. Si la respiración es dificultosa proporcionar oxígeno. Trasladar a un centro asistencial.

Antídoto:

Vitamina K1.

Clasificación toxicológica:

Bromadiolona: Grupo químico .4-Hidroxicoumarina
Este Producto es clase IV OMS: Poco peligroso.

Teléfonos de Emergencia:

Rita Chile: (2) 777 1994 (24 horas)

Point Chile: (2) 747 1677

Fabricado por:

Point International Ltd.
Inglaterra

Importado y distribuido por:

Point Chile S.A.
Avda. Pdte. Eduardo Frei M. N° 9950 OF. 10,
Quilicura Santiago, Chile.

Modo de acción: Anticoagulante.

Registro ISP: P-422/10

Destruya los envases una vez vacío, sin contaminar.

